Desinfectante para el control de mastitis

Generalidades

Agrisept se presenta en tabletas desinfectantes efervescentes de 5 g. solubles en agua, diseñadas para una alta desinfección de ubres en vacas en ordeñe. Cada tableta contiene 2.5 g. de NaDCC (ingrediente activo) que disuelta en agua libera un potente y seguro sanitizante.

Las soluciones de uso no son peligrosas para el hombre ni los animales, y el NaDCC y sus productos de degradación son biodegradables a elementos naturales del medioambiente. Las soluciones de Agrisept son altamente efectivas y tienen un amplio espectro de eficacia contra bacterias, virus, hongos, micotoxinas y esporas. Cada tableta de Agrisept contiene 1500 ppm de cloro activo

La solución obtenida tiene pH 5,5 – 6,5 compatible con la piel, por lo que no reseca ni irrita la misma. Al ser un pH casi neutro, no es corrosivo como otros desinfectantes clorados.

Al presentarse en tabletas, es fácil de transportar y almacenar. No es necesario transportar soluciones líquidas en grandes cantidades, disminuyendo costos de transporte y ahorrando espacio de almacenamiento.

La solución preparada mantiene su capacidad de desinfección durante 7 días en envase cerrado y correctamente almacenado.

Las tabletas se fabrican bajo los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura certificadas por la Unión Europea.

Aplicaciones

Para desinfección de ubres en vacas en ordeñe

Activo contra: *Strep. agalactiae, E. coli, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Clostridium butyricum, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Micrococcus lutea, Bacillus cereus & subtilis, Staph. aureus* (y muchos otros).

Almacenamiento

Almacenar en los envases originales cerrados, en lugar seco, bien ventilado y sin exponer a la luz del sol.

Dosis recomendadas

1 tableta en 1 litro de agua proporciona 1.500 ppm de cloro latente activo.

Antes del ordeñe	**No. de tabletas**	**Litros de Agua**
1. Lavado de ubres		
a) Durante brote de Mastitis	1	1
b) Prevención rutinaria de Mastitis	1	10
2. Aplicado con spray	1	1
3. Aplicado con copa (inmersión)		
a) Durante brote de Mastitis	2	1
b) Prevención rutinaria de Mastitis	1	1
Después del ordeñe	**No. de tabletas**	**Litros de Agua**
1. Aplicado con spray	1	1
2. Aplicado con copa (inmersión)		
a) Durante brote de Mastitis	2	1
b) Prevención rutinaria de Mastitis	1	1